


農圃門 上下

攷事新書 五



故事新書卷之十

農圃門上

占候

論歲正月一日鷄二日狗三日豕四日羊五日牛
六日馬七日人八日穀清明溫暖則蕃息安泰風
雨陰寒則疾病損壽○上元日晴春水少括云上
元無雨多春旱清明無雨少黃梅夏至無雲三日
熱重陽無雨一冬晴○二月朔驚蟄蝗朔春分歲
凶朔日雨稍惡穀貴朔雷初發歲美甲子雷五穀
農稔○三月三日天陰或雨蚕喜○清明午前晴

早蚕熟午後晴晚蚕熟○清明寒食前後有水而
渾主高低田禾大熟四時雨水調○四月朔晦大
雨大蝗初八雨無麥十三亦然立夏後夜雨便損
麥蓋麥花夜吐雨多花損故麥粒浮秕也○五月
上辰上巳雨蝗虫隨雨道食禾其驗如神○夏至
前芒種後雨為黃梅雨田家初插秧謂之發黃梅
○夏至日雨其年必豐○端午日雨末年大熟○
六月不熟五穀不結月蝕旱○七月西南風主田
禾倍收○八月朔陰雨來年大熟朔與晦大風春
寒夏雨○白露雨為苦雨補禾需之則白飢蔬菜

露之則味苦○九月諺云重九雨米成脯又云重
陽濕漉穰草千錢束○十月之冬晴則一冬多
晴雨則一冬雨亦多陰寒○十一月冬至夜半天
氣清物不成多風寒風從子歲稔西北間來傷禾
稼西來秋多雨西南間來夏多旱○冬至無冰虛
癢○是月中遇東南風謂之歲露有大毒若飢感
其氣開年著瘟病○冬至日取諸種各平量一布
囊盛之埋窖陰處勿令人履其上後五日升一云後五
日春日一云發取量之息多者來歲所宜也○十二
月立春在殘年至冬暖諺云兩春夾一冬無被煖

烘

論月○月生耳占晴雨諺云南耳晴北耳雨月生獲

耳長而下垂名白日幢主久晴

論月○月暈主風何方有闕即此方風來○新月下

有黑雲橫截主來日雨○月盡無雨則來月初必

有風雨○廿五日謂之月交日有雨主久陰廿七

廿八交月初二初三勿背晴

論星○諺云一個星保夜晴此言雨後天陰但見一

兩星此夜必晴

論雨○諺云雨打五更日晒水坑言五更忽然而雨

中必晴甚驗○雨着水面上有浮泡主卒未晴○
諺云天下太平夜雨日晴言不昉農也○凡久而
至午少止謂之遣晝在正午遣或可晴午煎遣則
雨不可勝○龜灰帶濕作塊雨此
論雲○雲行占晴雨諺云雲行東雨無踪車馬通雲
行西馬測減沉水沒犁雲行南雨潺減水漲潭雲行
北雨便是好腰穀○雲起自東南來者絕無雨
論虹○俗呼虹為蜃諺云東蜃晴西蜃雨
論霜○每年初下只一朝謂之孤霜主來年歉連次
兩朝以上主熟

論雪○至後第三戌我國茅為臘前三兩番雪謂

之臘前三白大耳菜少諺云一月見三白田翁笑

嚇也

論花○梧桐花初生時赤色主旱白色主水○扁豆

鳳仙花開在五月主水○藕花謂之水花魁開在夏

至前主水

論草○草得氣之先者皆有野驗齊菜先生歲欲甘

葶藶先生歲欲苦藕先生歲欲兩蒺藜先生歲欲

旱蓬先生歲欲流水藻先生歲欲惡艾先生歲欲

病孟月占之○草屋久雨生其上朝出晴暮出

雨

論木○五木者五穀之先也欲知五穀先視五木擇

其木盛者來年多種之萬不一差蓋禾生于粟或

楊稻生于柳或楊大麥生于杏小麥生于桃黍生

于榆大豆生于槐小豆生于李麻生于楊或荊○

當年杏多稟大麥不蛀桃多稟小麥不蛀

論禽○鵲巢低主水高主旱近地其年大水○鵲鳴

仰鳴則晴俯鳴則雨○母雞皆負雞雛謂之雞蛇

蛇主雨

論魚○黑鰱魚脊翼長接其尾主旱○夏初食鯽魚

脊骨有曲主水

論出○平地蟻陣作主風雨○蚯蚓俗名曲蟮朝出

晴暮出雨○夏至日蟹上泥夏至後水到泥

祈穀

春社日當祭五穀之神以祈一年豐熟秋社日亦祭

以報一年秋成○收穀上倉必用牲酒祭於同倉

之神

擇種

凡種薊浥則不生雖生亦不實種雜者禾生早晚不

齊春復減而炊難熟宜揀純色堅策不雜不浥者

簸揚去粃後沉水去浮者漉出曝乾以十分無濕

氣為度盛於葉為空石俗名之類藏置高爽處或高懸

屋樑以防鼠耗○種或傷濕鬱滯則出生用雪計

漬之○雪者五穀之精冬月以大瓮埋置地中溫

處至令不凍至臘月亦可收雪盛貯厚蓋苦薦

蓋勿使兩水流入至種時漬種其中漉出曬乾如

此三度則禾稼耐寒而肥所收必倍用水槽盛

牛馬尿漬種其中漉出晒乾三度牛尿煮蘭

蛹繭東以其汙漬種亦妙取馬骨剉碎以水煮

之去滓漬種曝乾天陰勿浸如此三四度下種時

以餘汁浸而種之則苗種稼不蝗麥種耳與刈
碎蒼耳或文暑日耳軋軋帶熟收三伏日用蒼藏以
瓦甕先將稻草灰鋪缸底洩以灰蓋之則不主
稷及蕎麥雖不稟種之善生大麥雖斂池亦無無
妨有不儲麥種刈其蒿而種之者年心豈熟小豆
木綿灰真灰愈陳愈好

收糞

作尿灰法 牛廐外作池貯尿以穀秸糠粃之類燒
為灰用貯池尿拌均為糞燒灰有火袂草交合
人尿雜積灰基以苦草蓋之暖斂運蒸 胡麻殼

剉積牛馬廐踐踏經冬者及木綿子祀廐尿者皆
可糞田 秧草軟柳枝及真樛俗名以斫刀打節
用廐下水或人尿沾濕或牛馬廐踐踏祀溫灰及
人尿積置以苦草蓋之善蒸自頭翁草亦可而甚
毒多布傷袂須雜以芳草俗名兒如上述蒸而用
之春夏間剉細柳枝布牛馬廐每五七日取出積
之為糞 七月刈白藁軟枝柔枝樛木枝葉樛一云枝
葉至秋以斫刀截斷作坎為廐池積置之令廐水
注濕或置牛馬廐踐踏待蒸糞田則雜穀無不茂
盛尤宜兩麥 秋間茄子播盡後乳葉藏之明年

剉入秧基極好

耕播

耕田忌壬辰癸亥日

一云壬辰日

種田忌丁亥日

博物志

云九焦日種穀則不生芽正辰二丑三成四未五

卯六子七酉八午九寅十亥十一申十二巳謂之

苦焦日

甲寅田相死丁亥田父死丁未田母死

乙巳田主死癸巳后稷葬右般日最忌耕犁播種

揮秧正戌二亥三子四丑五寅六卯七辰八巳

九午十未播種無所收黃白土宜黍黑墳宜麥

赤土宜粟污泉宜稻荒地辨試之法剉土一尺

深嘗其味甜者為上不甜不鹹者次之鹹者為下
耕地徐二則土軟牛不疲春夏耕宜淺秋耕宜深
春耕則隨耕隨活秋耕則待土色乾白乃活
春耕宜遲秋耕則宜早屋者以春凍漸解地氣始
通雖堅硬之土亦可鋤犁早者欲乘天氣未寒時
陽和之氣掩在地中也世人只知犁深為功而
不知擺細為全功擺鹿則根在鹿土出咬乳枯擺
細則根着柔地不生諸病荒地開墾初耕宜深
再耕宜淺不深則地不熟不淺則動生土開墾
荒地燒去野草犁過先種芝麻鄉名一年其草木

之根悉皆敗爛後種五穀則無荒草之害蓋芝麻
之於草木若錫之於五金性相制也荒田七八
月間耕之掩草明年冰解又耕下種大抵活田之
法秋耕過冬為上旱田初耕後布草燒之又耕
則其田自美薄田畊菜豆待其茂盛掩耕則不
秀不出變瘠為良凡美田之法菜豆為上小豆胡
麻即真次之五六月中播種七八月犁掩穀之為
春穀田則畝收十石濕田不宜種穀處經霜後
刈草厚布種少麥則麥極好而翌年變為乾田至
種木花亦宜沮澤潤濕荒地三四月間水草長

成時用輪木殺草待土面融熟後下晚稻種又轉
柴木兩三箇曳之以牛覆其種明年可用來地名保
三年則可用牛耕稂莠不生大省鋤功其輪之制
木用堅剛木長可四尺為五銳隅面頭貫木環以
繩繫環令兒童騎鞍牛或馬以繫環繩結鞍後
兩傍牛馬行則輪木自回輒殺草破塊若沮甚不
可入蹈之地用栳俗名兜殺草下種新墾草木
茂密處為水田者火而耕之三四年後審其土性
用糞殘年開墾待水凍則土脉春來易平又不
生草平後必晒軋入水澄清方可撒種不種陷土

易生 凡播種之法有漫種樓種瓠種區種之別
漫種者用料蘿盛種夾左腋間右手料取而撒之
隨撒隨行約行三步許即再料取務要布種均勻
則苗生稀稠得所南方麻麥粟豆多用點種便於
鋤耘若地廣土肥須用漫種北方多用樓種其法
甚脩齊民要術云凡種要牛遲緩行種人且促步
以足攝隴底欲土密種易生也今人製造碓車隨
樓種子後循隴碾過便根使土相着功效甚速瓠種
者窠瓠所種隨行隨種務便均勻犁隨樓邊覆土
既淺雖旱雨不至掘拽暑更最為耐旱且便于鋤

區種之法凡山陵近邑高危傾仄皆可為區田糞
種水澆脩旱災也山澤有異宜地勢有良薄山
田宜種強苗以避風霜澤田宜種弱苗以求華宗
良田宜種晚薄田宜種早良田非獨宜晚早亦效
害薄田種晚必不成實也凡五穀上旬種者全
收中旬中收下旬下收地多濕而腴者宜種早
地多燥而剛者宜種晚土之濕腴者地力旺生物
早種晚則穀不及地力而反損土之燥剛者地力
緩生物遲種早則土不及穀性而不秀明在此者
為上農昧於此者為下農其間只爭分毫而收利

倍万知要故也北土寒氣晚解穀麻綿之耕種
皆當隨時適宜貧民惜穀播種甚疎則莠莖餘
孽受氣不專故得米小而不定所以播種密播為
當田腴則一粒所滋多至三十餘莖

稻名

早稻 鷄鳴稻 莖芒色微黃耳晚寒食後即種之驅
雀軍難 柳稻 有芒微黃種之遲後收鷄鳴稻
波浪粳 五利 無芒色黃耳晚寒食後十餘日種之
米性甚佳酒食皆好中實稻 芒白色微黃耳晚
柏多里 莖芒色黃志軍粒肥沃地冰折稻又

名救荒堯五利無芒色黃皮薄其性太早米白而
軟宜膏腴不濁之田須於三月上旬解冰初種之
自蔡有芒初發穗時色白熟則黃土宜種候上
同著光有短芒初發穗時色微白熟則黃赤米
白宜飯耳鈍性耐風忌赤田雖虛浮不實之地亦
能發穗而實種候上同

次早稻 飫雨利有短芒初發穗時微白熟則芒黃
赤甲淡黃米先白作飯甚軟性健宜虛浮不稟之
地種候上同 倭子芒甚短若無初發穗時色青
熟則芒黃甲微白作飯則軟耳鈍性畏風忌瘠田

須種膏濕地 黃金子芒長初發穗時色白熟則
深黃與所老大同子長大稍早未白作餅則軟耳
鈍性畏風忌高瘠宜膏濕地慶尚道好種之
晚稻 沙老利芒長初發穗時色志熟則微赤米白
作餅軟耳鈍性耐風忌瘠田宜膏腴水寒之地
小甕五利無芒初發穗時色青熟則白得米多而
色白作飯軟性最惡風宜膏腴不渴之地 黑沙
老里有短芒立苗時色青胎則色紫黑藁節著葉
慶淡黑初發穗時芒甲皆黑熟則甲微白眼黑著
子密白米作飯軟性健耐風不擇地 高麗沙老

利芒長初發穗時色白熟則色微黃土宜上同
襄老利芒長初發穗時色白熟則芒黃甲微黃子
長大米白而強不宜舂性忌瘠地而又惡虛浮須
種膏腴地晚倭子芒短初發穗時色微白熟則
芒黃甲自東阿老利芒短初發穗時色青熟則
黃米自作飯軟性健耐風不擇地牛得山稻芒
長初發穗時及熟色皆志米自而差少作飯強耐
風膏瘠皆宜種黑黔夫歧芒長志初發穗時色
微白熟則眼甲皆微黑米自而軟宜舂性健耐風
土宜上同東昇艮利芒長初發穗時色微白熟

則甲白眼微赤皮薄米白作飯軟性耐健風土宜
上同靈山雙五利無芒初發穗時色青熟清眼
微黑甲微白皮薄米白作飯軟性健耐風種耳膏
腴地高灑嫩去味芒長初發穗時色白熟黃莖
節黑米粗白作飯稍強性健耐風膏瘠皆宜多
多歧又名御飯米芒長而稍曲初發穗及熟色皆
白米白甚軟軍宜作飯性健宜種膏濕地藝樹
利有芒色志芒種時種之亦能成熟軍宜移秧
密多利無芒色淡赤非膏沃不可種粥食餅皆美
大寒稍無芒色淡志耳鈍尤宜稍秧九齡粘

無芒初發穗時色微志熟則甲微赤米白性健宜
種膏腴地 衰老黏芒短初發穗時色微青熟則
黃皮薄米白性健耐風膏瘠皆宜種 多二歧黏
與多二歧租全 黏山稻無芒初發穗時色微白
熟則甲白米白稍強耐風宜種膏燥不濕之地八
月上旬熟 麴山稻無芒初發穗時色青熟則微
白米志強不宜作餽性健耐風宜種瘠地早種

種稻

種稻有早有晚耕種法有水耕有乾耕又有插種除
草之法大抵皆同

早稻秋收後擇連水源膏肥水田耕之冬月入糞或

正月解冰耕之入糞或新土或河泥或麻餅

或綿花子餅至二月上旬又耕之以木斫俗名鋤

從橫摩平復以鉄齒攪俗名小打破土塊令熟先

以稻種漬水經三日漉出早稻清明前浸於池

失然後取出或於瓮缸內用水浸數日微見白芽針

以草掩生芽若浸於瓮缸內流水則難得生芽出納藁

箭中置溫處日三陰慶晴則曝暖溫湯頻開

視勿致鬱滯芽長二分均撒水田中撒時必清明

以板撈俗名或把撈推介覆種灌水後撒種二三日

于上則限苗生軀鳥苗生二葉則去水以手耘去

苗間細草訖又灌水每耘去水耘迄復灌而苗弱
時宜戔苗強時宜深以水連通維旱不渴處則
每耘迄決去水曝根二日後還灌水則耐風與旱
苗長半尺許又耘以鋤耘時以手按軟苗間土面
凡禾穀長盛唯賴鋤功可耘三四度且早稍性速
不可少緩穀胎則只可信手輕一拔除不宜入
鋤用鋤則根傷而損穗人耘時搜鬆稻苗旺時去
揚斷橫根則頂根直生向下稻苗時去水旺耘
草用灰糞麻粃相和撒入晒四五日上乳裂時灌
水殘浸稻秧謂之肩田謂近秋放水謂將泥塗光

先之槁稻待土僅裂上水浸之謂之還水穀成
熟方可去水有水則熟遲將熟去水早稻善零隨
熟隨刈

晚稻水耕正月冰解耕之入糞入土與早稻法同今
年入土則明年入糞或入雜草互為之其地或泥
濘或虛浮或水冷則專入新土或沙土瘠薄則有

牛馬糞及連枝杆葉俗名草人糞蚕絲亦佳三月上

旬至芒種又耕之晚稻穀雨前後種大抵前晚耕種者不

實清種下種種灌水耘法皆與早稻同六月

望前三度耘者為上六月內三度耘者次之不及

此者為下

軋

播法春旱不可水耕且軋耕

惟種晚稻其法耕迄以耨

木打破土塊又以木斫縱橫摩平熟治後以稻種

一斗和熟糞或尿灰一石為度足種限苗生驅鳥

苗未長或不可灌水雜草生則雖旱苗稿不可停

鋤古語云鋤頭自有百年禾老農亦曰苗知入功

軋播後土鬆不密則種子或腐傷或虫食須以土

莫翻地為之木塊曳其上使土堅密待立苗以柴壩

翻地曳其上則苗立而草死愈頻愈好苗盛則止

且軋耘一次後灌水則苗盛

苗種法

秧也

擇水田雖遇旱不乾處二月下旬至三

月上旬

可耕每水田十分以一分養苗餘九分以

擬栽苗

拔苗處并熟養苗處

先耕養苗處如法熟治去水到

柳枝軟梢厚布遮足踏之曝土令乾後灌水先漬

種三月漚出入藁箔經一日下種後以板撈覆

種苗長一握以上可以栽之此法便於除草而萬

一大旱則失手農家危事也秧基以灰和人糞

布秧基而假如五斗落種多年秧基則和糞灰三

石若初作秧基則和糞灰四石適中和糞時極細

調均若糞塊未破穀者其上反致浮釀胡麻殼木

綿子祀底尿者亦可

秧基犁耙三四遍揀秧處

亦然

沙田秧基不待曝土目水下種不然暫乾

秧不著根凡地品不強或目水雨不得如法曝土

處有秧種浮釀之狀則去水如根未著土以沙量

宜疊之根著後貯水乾秧法春旱秧基無水熟

耕乾田治令無塊作小畦將稻種和灰糞種如乾

播而一斗落地可種七斗得兩移秧則勝於水秧

種秧法先耕移苗處布籽葉俗名葛草或牛馬糞草

甚好而所欠節晚然日臨移栽時又耕之如法熟

日茁長可以計日移秧治令土極軟在小溝芒種前後南方多在後秧就

水洗根去泥有稗草則揀去每作一小束却於穽
熟水田內栽插每一窠栽不過三四苗四五根為一叢
六寸插務要窠正行直以便耘根未著土灌水不
可深曝土時以人跡暫印為度移秧處水將乾
涸移栽甚急而秧苗尚弱若貯水於秧基則秧苗
自然出水長成然弱而長移種時不無折傷之患
苗種或不昂移插有過時爛點處俗稱厚布氣
草於苗上焚之後昂灌水待其葉間新芽抽出寸
許或量宜長短移種則與趁時插秧者無異

及種法水田無水新草荒蕪未易除却處待水掇取

禾苗不至損傷者求之反耕更種一如苗種法則
鋤耕甚者雖有水處人力不足難於除草則亦行
此法禾甚盛勝於苗種或云禾不足而老農屢經
之人皆曰足以種矣

火耨法禾苗至兩三葉則先放水乾草量其均布以
火焚之即為灌水則雜草盡死苗長自茁雖不鋤
耕所收倍多中國南京一人至種五六石之多者
用此法也然非燥濕任意之處則決難行之水灌
之無傷過時草盛難鋤之苗以木斫爲牛摩治如
初種時旋即鋤之則易耨而苗盛

種山稻法稻種甚多大抵皆同而別有一種旱稻旱偏
宜於高地及水冷處然土太燥則不成二月上旬
耕之三月上旬至中旬又耕之作苗是種訖隨而
背令既耘時去苗間土分攤地差瘠薄和熟糞或
尿灰種之或早稻三分種二分小豆一分相和而
種蓋以歲有水旱九穀隨歲異宜故交種則不致
全失也

黍稷粟秫名

霜山黍莖青甲灰色稟白三月膏田種之注非黍
莖稍黑甲灰色稟黃種候上同建伊黍莖赤甲

灰色寡黃種候上同 漆黍莖青甲灰色寡黑種
候上同

以上黍名

阿海沙里稷無芒熟則微白二月晦膏濕地種之六

月晦熟 五十日稷無芒熟則微白二月晦膏濕

地種之六月望熟 長佐稷芒長熟則微白水氣

膏濕地皆種之七月初熟 中早稷無芒熟則微

自土宜種候上同 姜種無芒熟則黑土宜上同

八月晦熟

以上稷名

三葉栗芒短莖赤實微黃宜早種膏田五月熟 爪
花栗芒短莖白稟黃土宜上同六月熟 灰蹄栗
芒長莖亦稟微白膏瘠皆宜種七月初熟 都籠
箕栗無芒莖與稟微白土宜上同七月熟卧鹿銜
莖栗芒長穗長稟稍青土宜種候上同 卧如木
只栗無芒莖白項長稟黃土宜種候上全 水青
栗芒短莖青穗長熟則灰色土宜上同八月熟
晚種栗芒長莖青熟則黃不擇地晚種八月熟
鳥鼻銜栗芒長莖微白稟黃膏瘠皆宜種七月熟
磬擊栗無芒莖青穗短而本小末大稟黃種候

上同晚種黏粟芒短莖赤熟則微白宜膏地五月
種之八月初熟生動黏粟芒短莖赤熟則灰色
膏瘠地皆宜種之七月熟縷繹黏粟無芒穗多
歧莖青熟則黃土宜種候上全黑德伊栗芒
短莖赤熟則黑土宜種候上全開羅栗芒短莖
青熟則黃土宜上同四五月種之八月晚熟節
不知粟無芒莖白熟則微赤春年田雜播刈年後
鋤之霜降後始熟

以上粟名

蜀黍一名蜀秫俗稱唐黍蒙駭唐黍無芒熟則志

士宜種候上全米唐黍無芒熟則微白土宜種
候上全 育于唐黍芒長熟則赤土宜種候上同
林似黍而粒少米黃釀酒最佳

以上林名

種黍稷粟秫

種粟三月三卯為上種黍忌蜚卯日稷種忌未寅日

凡治田之法秋耕過冬為上而粟田尤甚 凡穀菜

豆瓜底為上胡麻底次之蕪菁大豆底又次之

清明耕早黍粟 早黍早穀粟三月上旬晚黍晚粟

三月中旬至四月上旬可種黍粟性喜高燥不宜

下濕地細沙黑土相半者為良田若瘠薄則用熟
糞或尿灰種之而每畝粟二三升和糞灰一石為
度先用小豆稀疎播撒後耕之以水荏子與黍或
粟相和水荏子一分黍或粟三分逐畝左右足種交踏左右足交
成覆及苗長間生雜草與窠密處鋤而去之以土
擁根鋤至三度分以無草傳鋤黍苗弱時鋤之則
待禾成長兩畝間雜草茂盛用一牛網其口徐驅
耕之分致損禾使苗間無穢土擁禾根黍心末
生雨灌其心則傷黍心初生畏天露每日早用糞
麻散絰長繩上令兩人對持於黍上牽曳抹去其

露則不傷 黍熟易零遇風則失收及其半熟即

刈粟待十分黃熟可刈粟熟則宜連刈乳則速收不然恐致拋散 稷

性宜下濕地二月中旬耕之以木斫熟治自三月

上旬至四月上旬皆可種法與種黍粟同或撒

擲亦得田若瘠薄則用糞灰熟灰與灰也或先布雜草

在苗間後耕種鋤至二度稷亦有晚種早熟者

兩麥俗名稷底六月上旬可種 種粟春欲深夏欲

淺凡遇小雨宜趁濕種若大雨鋤一遍然爬後句

種之候苗出頻鋤多則不稠 間種之粟或同

雨澤莖節過為茂盛則穗而不稔綱牛口耕兩畝

間掩土於莖節則更生新根發穗長而案漢人
種禾禾法預聚灰灰二邊斫置燒木木灰灰五石則聚石於
木上燃火待其石紅如火石上以其灰周匝覆之
灰上周以空石覆土於其上心作大堆以水灌之
灰五石則如埋麻法過一兩日後去石與土則其
水水五石則如埋麻法過一兩日後去石與土則其
灰倍重於前耕田作畦布灰而畦之間覆土均之
以踵作竅盛粟種於頭用瓢而作細孔使粟種自
其孔下蓋欲其均下也下種後以胡犂耕其畦使
土覆於種粟之處均土堅踏則其粟速生且短待
其稍長又以胡犂耕畦則草埋粟長如是者數次

仍又略除其章粟莖雖不長其莖則極大長一日

耕可收三十石少亦為二十石粟又有晚種早

熟如青梁鄉名生占梁鄉名占之類擇土厚久陳

地種之艾除林木為上久陳五月伐草待乾火之

灰未冷時撒擲粟種灰冷則地種不至地以鉄齒攪

起土覆種鋤草省力所出倍常蜀黍性宜下濕

不宜高燥二月早種鋤不至再而收多

豆名

黑豆甲赤稟黑如榛子大宜膏腴地五月種之黃

惱豆甲黃稟黑如鼠眼大宜膏濕地三四月種之

九月熟 萁大豆甲黑青色窠黑赤如榛子大宜
瘠地種候上全青豆時最軟 火豆甲微白窠深
赤皮薄如梅子大甚軟麥根種之季秋始熟 黃
豆甲或微白或微黃窠微黃榛子大薊根種之如
八月晦熟 百升豆甲與毛灰色窠黃如鼠眼大
五海皮豆甲白窠志白如梅子大薊根種之八月
熟 六月豆甲白窠白如篇豆大三月種之
春小豆甲白窠赤眼白如櫻桃大粟田雜播八月熟
根小豆甲白窠深赤眼白如櫻桃大薊麥根種
之八月熟 早小豆甲黑窠赤眼微黑如櫻桃大

黍粟田雜播七月熟山達小豆甲白窠白眼赤
白如麻子大舞麥根種之八月熟燕夫妻小豆
與達山同而稍大忍冬小豆甲白窠半白半黑
眼白莖微赤黑四五月種之黑小豆甲白窠黑
眼白如樓桃大黍粟田雜播
菜豆菜本作綠甲黑窠青宜種膏地五月種沒衣
菜豆甲灰色窠微黃瘠膏地皆宜五月種
扁豆俗名東背甲長微白每甲窠十莖青熟則微白
眼赤宜瘠地二三月種八月熟先將豆窠赤眼
白種候上全豌豆一名蠶豆色青似菜菜豆而

大今出咸鏡道京中籍田亦有之

種豆

大豆小豆種皆有早有晚早種俗稱春耕早種三月

中旬至四月中旬可種晚種俗稱根耕早種三月

田不可過熟下種每窠不過三四箇密種則少窠

然肥田種欲稀薄田種欲稠田若瘠用糞灰宜

少不宜多鋤不過再吐花時不可鋤則花葉落

盡收之苗出便耕收訖耕之以擬明年不耕則

無澤大豆根耕刈麥根耕及收皆與早種同

但下種每窠四五箇小豆根耕與大豆耕同但

撒種於麥根訖覆耕之一鋤而止田少者兩麥未
穗時淺耕兩畝間種以大豆收兩麥訖又耕麥根
以覆豆根大豆田間種秋麥小豆田間種粟皆同
此法用綱口牛耕兩畝與黍粟田同雜草還茂
則再耕之

種黑豆三月熟耕耜地手內握豆半抄行一步一撒
苗旺便鋤淨草為畦四月亦可種

菜豆薄田荒地皆可種也稀種一鋤撒種亦可

亦六

月刈麻地上種之太早不生角四月種六月收
子再種八月又收子一年再熟

菰豆五月間種薄田一鋤隨熟摘之
豌豆杜前於大麥根邊種之以灰糞勻蓋頻鋤至五

月收之諸豆中豌豆耐陳多收熟早
豌豆八月

間或挾麻間種同收

麻名

胡麻一名藤弘一名芝麻俗作脂麻黑者稱胡麻須

夫婦同種即茂盛
巨勝胡麻也參同契稱巨勝

尚延年水蘓麻俗稱水荏又稱油麻又稱白流麻

即麻之白者也

種芝麻

撒種於麥根訖覆耕之一鋤而止田少者兩麥未
穗時淺耕兩畝間種以大豆收兩麥訖又耕麥根
以覆豆根大豆田間種秋麥小豆田間種粟皆同
此法用綱口牛耕兩畝與黍粟田同雜草還茂
則再耕之

種黑豆三月熟耕耜地手內握豆半抄行一步一撒
苗旺便鋤淨草為畦四月亦可種

菜豆薄田荒地皆可種也稀種一鋤撒種亦可

亦

月刈麻地上種之太早不生角四月種六月收
子再種八月又收子一年再熟

菰豆五月間種薄田一鋤隨熟摘之
豌豆杜前於大麥根邊種之以灰糞勻蓋頻鋤至五

月收之諸豆中豌豆耐陳多收熟早
豌豆八月

間或挾麻間種同收

麻名

胡麻一名藤弘一名芝麻俗作脂麻黑者稱胡麻須

夫婦同種即茂盛
巨勝胡麻也參同契稱巨勝

尚延年水蘘麻俗稱水荏又稱油麻又稱白流麻

即麻之白者也

種芝麻

芝麻有黑白黃三種白者多油八稜者性宜白壤沙白

地荒地為良三月上旬為上時四月上旬為中時五

月上旬為下時望前耕者稟多望後耕者稟少三

月間兩浚則不兩濕耕之撒種若然田則四月上旬

麥根則趁刈麥後和糞灰種用穰不破塊覆土鋤

不過再隨熟刈之作束連要小大則難軋以五六束

相倚為荒候口開遞束倒豎以小杖輕打取了還

叢之三月一打四五遍乃盡以白胡麻三分晚

小豆一分相和種之或以菜豆二分胡麻一分相

和亦得耕訖作餅以所和種白撒覆土芝麻稽

收於米倉內則米不蛀
每窠相去一尺密則無枝少窠
油麻路邊或田畔宜種
一云四月上旬

苗種兩麥根耕時麥雨移種
長兩畝間

年麥名

秋耕芒長熟則微黃宜種膏
八月晦播種明年五地

月初熟節早則四月晦亦熟
春耕芒長熟則微

黃宜膏地二月解冰初種之五月熟
而節耕或

秋耕春耕或米耕無芒無糠熟則微黃播種節

候與秋耕同真麥芒長熟則窠黃膏地皆宜

種候上同英知麥芒長熟則窠黃宜膏地二月

鮮冰種之五月熟蕎麥俗稱水麥赤莖烏粒種之易為力不妨農而晚熟故也

種麥

大麥小麥宜白露節後戊日下種八月三卯為上

大小麥新舊間接食農家最急薄田白露節中田秋分時美田後十日可種種小麥八月上戊為

上時中戊為中時下戊為下時種大麥八月中戊

杜前為上時下戊為中時九月為下時大小麥

兩經社日佳兩麥早種則根深耐寒晚種則穗

小種太早又不可不早九月可下麥種若太遲恐寒鴉

種則出而有節

至食之則稀先於五六月間耕田曝陽用木所

摩平六月初旬四五夏乘露水下種時又耕之以

鉄齒擺或不斫背熟治密作小畝和糞灰撒種云一

密種布熟糞覆種宜厚明年二月間一鋤之麥十月

內有草鋤去不細則其麥小收黍粟豆木麥根田則預收收

穀前用長柄大鎌及草未黃時刈之積在田畔收

穀說以其草厚布田上大焚擲種及灰未散耕之

薄田倍加布草如未及刈草用糞灰如大小豆法

或於其田先種菜豆或胡麻五六月間掩耕待草

爛後又耕下種六月耕過稀種菜豆七月間

年種一斗和鹽一升種之勝於糞灰春夏間到

細柳枝七月刈自糞軟枝櫟木枝葉柰枝布馬廐

為糞宜兩麥四月間有沙霧用籬麻散於長

繩上侵晨令兩人對持其繩於麥上牽拖去其沙

霧則不傷麥大小麥宜三伏日晒乾用蒼耳拌

雲同收甚妙麥宜與刈碎蒼耳或
大小麥隨熟

隨刈麥半黃時趁天晴即收於場用苦蓋覆以防

雨作若不及輸場亦須輸運於場用高處蓋覆乘

夜輸入遇晴薄布於場上厚則雨車隨燥古語曰

取麥如救火若少遲慢遇雨則傷農家所收無過

於麥也。而麥收時農務正急，刈麥作束，田畔高
象以長木如土字狀交構，將麥束積之，穗向內，根
內外鱗次密積，作穴一面，則風不朽，雨不漏，震而
歇，后打入，但場畔則雖或如石積之，必生飛蛾，忌
之。春年二月間，陽氣溫，祀日可耕，盡二日止種
法。耘法收法與秋麥同。收春年及真麥取蒼耳
剉碎，和拌至未時及熟，收藏可二年不蛀。水田
中種年法，預收草糞於水田邊，待稻成熟後，即刈
旋耕，以年種和糞深種，以土覆之，則其年即生，且
茂。至春種秧，次有水之水田，待刈年盛，水移秧，其

稻甚盛

種蕎麥

蕎麥宜荒地

立秋在六月則節前

或三日內立秋在

七月則節後

或三日內乃其時也

早霜麥宜早耕不必待立秋

五月耕之待草爛六月又耕下種時又耕之田雖

瘠薄多糞則多收種子一斗糞灰一石為度灰火

則漬種亦可其法燒牛馬糞為灰以厩池水盛貯

水槽中漬蕎麥種半日漉出投灰中令灰粘著種

之若山林肥厚之地火耕撒種所收倍常蕎麥

稠密撒種則結稟多若稀則結子少蕎麥雜蘿

當耕之兩得 其實半黑半白刈之倒豎則皆黑

種薏苡

依種五穀法熟耕地相去一尺種一科不問高下但

肥沃地即堪尤宜下着牛糞

種木花

性宜雜沙燥田二月中旬翻耕三月上旬又耕之以

木斫熟治下種時更耕三月三日下午種所收倍多

或較兩下種或立夏前下種四月天氣溫蓋早耕

則雖有霜結凍必更先將線種以牛糞按磨以白

色盡沒為度時將種子用水浸片多粘聚灰轉看

乾灰箇大如榛子成畝後種木尖其下端打穴畝

上種作穴頻廣以尿灰或牛馬糞布穴撒種以推介

掩土鋤不歇多待其長盛畝間草茂用一牛網口

徐耕勿致損傷世之糞田者未耕前散糞田中其

每一尺作一次種五七粒待苗出時密者耘去

只留旺苗二三窠勤鋤苗長尺餘常稀去苗尖勿

令高二則不結鋤後須用大糞水澆之山谷或

平原荒田解冰後掘坎浸脰廣如方席種綿臨時

尿灰與牛馬糞填坑又如新土以綿種轉着牛尿

及熟灰如果子大一坑種五六箇待長成約七八

寸去其上枝則枝茂窠蕃可摘倍多明年坑傍又如
如是則三年後便為饒田俗人有間種真荏青
豆而不知損害不花專業摘花者絕不間種

種麻苧麻

種麻正月上卯為上土日種麻則不生古人云

十耕蘿薑九耕麻地要肥熟田多則宜歲易也則

皮薄節潤正月解冰擇良田耕之縱三橫三布牛

馬糞二月上旬更耕之中旬為中時下旬為下時

二三月皆可種臘月以木斫及鐵壺擺熟治使手
後足踏均密撒種又須均密不均不密則麻或虎

或枝不中於用曳撈覆種其上又布牛馬糞以灰

如撒子以土灰麻長三寸許有雜草則鋤之不過

一鋤耘宜帶露耘糞三兩次葉出則刪又有

晚種者夏至前十日內皆種可也翻耕麻田二

遍十月下旬種之以糞厚覆春乃早成六七月

間麻桿上生白膩時即刈攤宜薄束宜小漚宜清

水生熟要相宜每一斤可取皮四兩生麻微漬水

多取野中蔓麻畏之一晝夜即熟過時則爛

生布與紫葉同煮則白如玉苧麻九月寒莧菜

露後收子晒乾以濕沙拌白筐內盛之用草蓋覆

若凍損則不生俟來年二月三月肥地內撒種以
草蓋用糞沙壅之二年後移疎行密栽用灰糠糠拌
土五六月間看根赤便刈了用蚕沙麻糠糠拌
肥糞壅之八月半再刈五月研頭芋七月研即
用手攪斷剥下皮以刀刮白其粗皮自脫落薄
作小束搭於屋上夜間承露則潔有十月以後用
牛馬糞或厩泥糠粃之類蓋壅其根免致凍損
常留其根以灰糞壅上土草覆之或壓條來年成
芋新麻宜熟肥地臘八日種者舊正月二月亦
可

種紅花

二月種紅花種時欲雨漫撒肥白如種麻法以灰

糞或鷄糞蓋之澆灌不宜濃糞二月末三月初

雨後連下鋤培而掩種則子科大四月種晚紅

花須留春子自此至五月初散種木花田間過此

則晚也五月及收子便種晚花七月摘花其色鮮濃

耐之不縣勝於春種者花開時清晨摘微搗

去黃汁用青蒿蓋覆一宿浸一宿水拾成薄餅即乾

收用勿近濕牆壁近濕則地損

種藍

宜平地三月耕熟種之肥勻用荻簾蓋之每日早用

水洒至生苗去荻簾長至四寸高以肥地熟作畦

打溝成行離五寸栽一窠五月芒種兩接濕夜

栽之勿乾每日用水澆灌如地瘠則用清糞水澆一

二次地乾鋤五遍為良

七月割藍每藍一擔用水一擔將葉梗切細在鍋內

同煮數百沸去渣以汁盛缸內比熟藍三停內用

生藍一停摘葉在磨盤上手揉三次用熟汁澆柳

慮相合以淨缸盛之一云生藍汁二分和熟藍汁

置水磨盤隨磨即來仍存藍根候開花結子八

月收來春種之

種靛

先於舊年八九月間耕地肥手臘月間復耕一次至

三月臨種時又耕一次撒種後橫置復肥三四次

候生五葉時即鋤有草再草至五月間收刈打靛

正月中以布帛盛子浸之芽出撒之灰糞蓋之待

放葉糞水澆之長二寸許分栽成行仍用糞水澆

澆至五六月內將糞水潑葉上五六次俟葉厚

離土三寸割之夏至前後看葉上將梗葉浸缸內

靛缸大小用礦灰色青者量多寡下之每五斤

斤須浸一晝夜濾淨以木杓打轉青色為度澄清

去水是為頭靛水沈次日度黃色去梗用木肥打

水成其在池原根再以糞水澆登如前法收割後

打謂之二靛亦可取三靛今人多種福靛收麥

後以麥地種恐大雨築窠不出則以小麥芒和之

糞蓋之澆發浸打如前法

種茵草

種於地西則根連至池東多叢生種於池東則無一

叢生故世補向東草種茵草不可不知也

種蔬總叙

二月春分種諸蔬菜

凡種蔬菜必先燥爆其子地

不戢良薄則糞之鋤不戢頻旱則灌之蔬宜畦

種茨苽區種畦種法地長丈餘廣三尺先種數

日斷起宿土雜以蒿草火燎之以絕虫類併得為

糞臨種益以他糞治畦種之春必畦種畦長二

步廣一步大則水難勻旋耕以宿糞覆其上令厚

一寸鐵齒耙耨之令熟足踏使堅平下水令徹淨

水盡下種又以熟糞和土覆其上令上二寸餘菜

生每一耨輒耙耨地令土起下水加糞區種法

區廣可一尺許臨種以熟糞和土拌勻納於田

中使苗出視稀密去留之芽種法將種子先用
淘淨頓匏中覆以濕草三日後生芽長可拍許熟
後下種先于濕畦內以手飲之白摻芽生復篩細
糞土覆之以防日陽此去菜既齊出草又不生
香菜常以魚腥水澆之則香而茂米泔水亦能用
糞澆則不香凡菜有出用苦荬根并石灰水潑
之即死

種西瓜

西瓜宜沙地四月前三四日夏坑廣大沙土與熟糞作
和填下種四五枚出四葉壅土培根如此三四度

結宗繁大 多 大鋤則饒子摘去餘花則花肥大

種甜瓜

俗名真瓜

有癰瘕患脚氣人不可食甜瓜瓜洗水者及兩蒂兩

鼻并殺人

三月用鹽水洗子取淹過糞土種之

一云立夏前三四日種之 仍將洗子鹽水澆之候拖秧時摘去

蔓心再用糞土壅培根下甜瓜至大暑不熟者

以薰魚

即乾石首魚

骨挿頂則蒂落而易熟以缸盛

臘雪水用銅青末同入收貯甜瓜顏色不變

種瓜

一名胡瓜一名黃瓜

種瓜宜辰日

種諸般瓜宜戌辰日

諸般瓜子肥

地內種則芥肥大二月上旬種芥三月上旬次
之四月上旬又次之一云芥畏霜三月間以水淨
淘芥子起鹽少許以鋤耨却軋土坑大如斗納芥
子四枚種大豆三箇於坑傍蓋芥子藉依大豆為
之起土故也生數葉後掐去豆苗若拔之使土虛
燥塞灰根下兩日後以土培根永無虫若有蟻則
以骨之有髓者置芥窠左右待蟻多付而棄之如
此數次則蟻自無矣凡芥早爛者摘時腳踏翻
動其蔓故也散理慎護至霜降葉軋子乃盡如此
不必別種晚芥也凡芥最忌麝香芥田邊栽蒜

薤穀殊遇麝不損 大暑種晚菰以供冬藏 大

月收菰用淋退灰晒乾埋藏於窰內冬月取食如

新 凡菰蔓以土壅培其節則生新根而轉盛

種冬菰 一名芝地或
林自冬菰

先將熟稻草灰拌和細泥鋪地上鋤成行壅三月下

種 一云冬菰畏霜
氣盡後始可種之 每粒離寸許以濕灰篩蓋河

水洒之又用糞澆乾則澆水待芽頂灰于日中將

灰揭下搗碎壅于根傍以清糞澆之 十月收冬

菰宜高燥處安頓忌鹽酒醋掃帚猶大觸之若蒂

彎曲貼內是雌者可留做種

種匏

或稱葫蘆

二月下旬天晴日中種之

一云匏畏霜三月間每日無霜氣後始可種之

早以清糞水澆之長寸許鋤穴分栽一穴一藤

每早澆以糞水早則早晚俱澆蔓長用棍上棚

種大蒟蘆法正月中掘地作坑方四五尺深如之

案填油麻菜豆葉及爛草等一重糞土一重如此

四五寸向上一尺餘着糞土填之至二月每坑只

種十餘顆子待生後揀取四莖肥好者每取兩莖

以竹刀刮去半邊皮以物纏住以牛糞黃泥封之

一如接樹法裏之待相着活後各除一頭又取此

兩莖相著如此法待活後惟留一莖便是四莖作
一莖矣待結葫蘆揀取兩箇周正好大者餘并除
之則葫蘆極大一箇可盛一担米用大葫蘆繩
繫其腰涉江湖可以免弱

種薑

種薑

宜耕肥地令深

白沙地耕七八遍或五六寸掘

二寸許

三月種之

清明後三

以壅沙腐草灰糞牛糞

覆之每壅闊三尺便于澆水待芽發後摘去老薑

作棚蔽日

畦南宜種草麻以蔭頻以牛糞浸水

澆之八月收取

六月棚蓋或種蘆蔽日頻以牛糞浸水

九十月宜掘溪窖以糠粃

合埋煖處以為種置火閣亦可 薑田耕不嚴細
耨不嚴數 蠶出時種之享覆蒿草無使鷄扒蚕
上新時縱火焚之又覆真木葉腐之

種蔥

種蔥八月上旬以地作畦用灰糞拌子種之一月云七

蔥至來年正月一月云移栽二月去冗鬚微晒乾疎

行密排以鷄糞培壅 二月將蔥子與炒粟末相

和勻下下種不白輕曳撈覆土上布糞灰 八月

末旬將冗鬚去淨種之以猪糞鷄鴨糞和耕糠壅

五月芒種收蔥種

種紫蔥

十月作畦種之略鋪馬糞於其上至明年五月採乳
為種子關西及湖南人七月望日種之而每年易
田以種

種蒜

八月初旬

一云九月寒露種之早于肥地
一云白熟

耕三次鋤成溝畦隔二寸一窠以草鞋浸於小便

將種包在內夾糞土栽之上糞令厚其大如碗

候苗出頻鋤鬆根傍地以糞水澆之蓋出拔去則

辦肥大不熟則瘦小九月初栽稠蒜辦至二月

間犁地數次每畝上糞土數十擔再用犁耨過
勻二寸許插一竅栽蒜秧一株如旱時常以水澆
五月夏至採蒜早收皮赤料堅晚收皮脆易碎
種韭薤

韭懶人菜也不必歲種 韭最益人宜常食之而韭

殊辛臭養性所忌 春香補血夏臭破血 種韭

二月下旬撒子九月分栽十月將稻草灰蓋三寸

許又以薄土蓋之則灰不被風吹用猪雞糞廐之

魚水立春後芽生灰地可取食天若晴暖二月終

芽長成菜以割取田根常留分栽不須撒子種次

矣 韭根多年交結則不茂八月別作畦分栽
時摘去老根微留嫩根一歲而三四割之其根
不傷至冬壅培先春復生 薤似韭而葉濶多白
無稟雖辛而不葷五臟故道家常餌之 薤宜自
軟良地二月三月八九月亦得一云種薤不拘時或同蒜種之耕地三
五徧燥焙而種之薤燥則薤肥率一尺一本而以
七八枚為一本功却種根則瘦細不肥葉生昂鋤
鋤不嚴殺凡栽韭薤去冗鬚微晒乾陳行密擺
栽之

種芋

一名土芝
俗稱土蓮

揀芋種

圓長尖白者

就南簷下掘坑

以糞糠鋪底

將

種放下

稻草蓋之

至三月間取出

埋肥地

一月先鋤

過地

一過又

以新黃土

覆蓋

鋤過

却

待苗發

三四

將芋

一云

五寸

五月間

一月

三擇

近水肥地

移栽

或

葉

高四

五寸

五月間

一月

三擇

近水肥地

移栽

或

用河泥

或用灰糞

爛草

培壅

早則澆

之以水

鋤不

散頻

宜侵晨

露未乾

及雨後

耘鋤

全根

傷虛則

芋大

子多

八月

芋苗

正旺

鋤開

根邊

土却

上肥

泥

壅根

又蟠

得葉

則力

田於

芋頭

其子

肥大

泥勝

之區

種芋

法二

三月

作區

方淺

皆三

尺許

取豆

箕

納區

中踐

踏之

其厚

尺五

寸以

水澆

之令

濕擇

肥

大芋種每區以五箇置四角及中央復以豆箕覆而踐之早則數澆之一區可收三石

種茄

二月下旬天晴日中種之

社前種亦可

五月中旬結案云

茄畏霜三月間無霜氣後始可種之也

清明時與諸稻種浸同治畦

種之長二三寸許移栽宜稀每日早以清糞水澆

之茄性宜水常須潤澤初分茄秧時若早則澆

水栽之以物覆之勿令見日開花時摘去盛葉以

灰圍根結子倍多分栽時每窠根下入疏黃小

許

根上招開指疏黃見子大以泥培之

子多味甘其大如盞

六月

收茄用淋退灰晒乾埋藏於食內冬取食如新九

月茄種熟時摘取劈破取子水淘淨取沈者晒

乾收之

種芹

種芹處常令足水及二月加糞

種蘿菔

一名棠蔴
一名蘆蔴

二月上旬撒種三月中旬可食五月上旬撒種六月

中旬可食又曰六月撒種七月亦可若有陳子

過立夏即種至五月盡根大如拳又曰六月六月

種之又曰小暑種蘿菔七夕以後種萊蔴又曰

月二可種月二可食

宜肥良沙軟地

沙地尤佳
地度則用

糞

耕治二三遍疎下其種稠則根小多鋤為良

以蘿蒿撒下綿田亦佳雜蕎麥耕之則兩得撒

種後以灰糞蓋之頻日澆灌帶露耕地則生出

冬月取根於窖中倒懸著蓋却窖口隨即取用

二月取窖中所藏之根種於肥地至五六月收子

種蔓菁

一名
燕菁

肥地犂耕六七遍其不嚴細一畝用子三升六月白

撒種之七月亦可種時以鰻鱧魚汁其浸子晒乾

種之無虫。翻耕種蔓菁自處暑至白露皆可耕早

則根大葉小晚則葉潤根細種根收子與蘿菔同
蕪菁子欲得陳

種芥

二三月間春耕後十餘日種種芥至五月收子更
於七月分留五月所收之子至明春種之七夕
以後種芥又曰七八月下種頻用糞水澆之遇西
風九焦日則不可澆

種菘菜

二月上旬撒種三月中旬可食五月上旬撒種六月
中旬可食種後以灰糞蓋之頻澆灌七夕以

後種菘菜

種蒿苳

蒿苳白莖者佳紫者劣六月耕二三月間與芥子同種至六月收子更種苳七月八月下種待長治畦分栽來年摘取隨澆中心肥大即蒿苳

種白菜

八月擇肥地以犁鋤過用糞土淹之打成畦壟漫撒其子待出芽約三寸高拔起成行於畦內栽之用澆水澆壟待根定葉起便用糞澆四十日乃可食之九月十月亦可種七八月下種九月治畦分栽

頻用糞水澆之遇四風亢焦日不可澆

種菠菜

七月以水浸子二三日看殼軟撈出控乾就地以盆

蓋合候生芽宜肥地鬆土內種之以水澆灌則茂

初種時務要過月朔內生假如初二三日種與廿

六七日種者皆過來月初一日方生驗之信然菜

同治地擇細用糞極肥然後下子仍以馬糞蓋之

既長不可用糞澆

種胡荽

先將子擇開四五遍七月八月晦日晚宜種之宜濕

地以灰蓋之水澆則易長

種冬葵

地不嚴良薄則糞之故墟弥善春必畦種葵生三葉

然後澆之用晨夕秋則旱種十月末地將凍散子

種子正月末散足踏之乃佳地濕即生鋤不嚴數

五月初更種之種此以六月一月種白莖秋葵白莖

者宜乾紫莖秋葵堪食仍留五月種者取子春葵則子

熟者乾不於此時附地剪却春葵其根上種生者柔軟

至好味於秋葵八月半剪去秋葵枝多者則去

則去地研生肥嫩待霜降收之高與人膝平莖葉

皆美其尺葉堅硬不生中食其碎者割訖即地中尋
手糺之以穰草覆蓋經年收子謂之冬葵子可入

藥用

種青蘘

畦中種之法如種菜候苗出堪食常留子種至秋其
美甚骨美不減於葵亦堪沐髮

種雞冠

坐種則矮立種則與人齊手種則花成穗用簸箕扇
子種則其花成片可觀

種南棗

宜燥土二月下種四五月間遇雨移栽
種當風處

則多寡

種熊蔬

宜肥濕地三月晦間取根種之

種冬蔬

宜沙地三月晦間取根種之

種首蓿

地宜肥熟七月作畦種之澆水一如韭法

鐵杞樓土
令起熱浚

水下

早種者重樓地使壅深潤竅艸下子批契中

之每至正月燒去枯葉地液輒耕壅以鉄齒鋤撲

之更以魯斫斲其科土則濕茂不爾瘦矣一年三
刈其苗留子者可一刈卽止春初亦中生噉為羹
甚香美偏宜飼馬口无嗜之此物長生種者一勞
永逸都邑負郭所宜種之

種當歸

三月可種生筭後種之赤活冬作土字種於其中以
濕水之灌黃芽茁長食之極美種依山或墻
陰地則盛若苗秀而開花結實則翌年不生

種羊蹄根

採根置坑中冬月蓋藏勿令入寒氣則萌芽即生取

煮以羹柔滑味最佳亦足充腹取芽後還置坑中
旋摘旋煎用之無窮

生菌葷法

榆柳桑槐楮為五木茸煮漿粥安木上以草覆之即
生茸 取爛朽木及葉埋於地中常以米泔澆之
令濕三兩日浚即生本是朽木不損人 又法畦
中下爛糞取朽木長六七寸截斷槌碎如種菜法
畦中勻布土蓋水澆常令潤如初有小菌即摧之
明朝又出亦摧之三度後出甚大收食之最佳
生松木彭木真木者亦無毒

種鳳仙花一名隱

宜肥地春間撒子夏花窠取子榨油以和飲食則味

勝勝直油

政事新書卷之十

攷事新書卷之十一

農圃門下

種樹總叙

凡栽樹正月為上時二月為中時三月為下時崔寔
月令曰正月自朔及晦皆可移樹又曰種木盡二
月古人云移樹無時莫教樹知多留宿土記取
南枝先為坑寬深納樹訖提起樹根要使舒暢記
其陰陽莫令轉易用清糞水和土成泥覆於根上
搖之良久沉入根間然後下土緊等而近上三寸
不等取其柔潤每澆水即以糞土覆則保澤三四

日後方可
用水澆

大樹髡葉小則不髡功宜愛護勿令手

把動搖及六畜舐觸

凡移大樹於坑中布秋年

十餘斗而種之百種百活

移樹勿令土上舊痕

四隅樹大柱用繩綫之令大風不搖根頃時決

汝淳移種花必帶舊土并標其南北縛長架使木

不搖動故合抱之木無不立活諸果木月半前

種者多窠月半後種者窠少

核種法凡種核入土深則不生入土纔寸許冬月凍

折易生

枚種法三月上旬一二月斫取名果直枝嫩好者如

指大長五寸挿芋中種之如無芋大蔓菁根蘿菔
根亦可用此勝核種生二歲以上即可移種凡
雀樹大枝之中有橫生小枝從小枝上下數尺斷
其大枝為丁字形以鐵兜火燒烙定兩頭橫埋於
地使大枝為根小枝為株必活凡挿花枝先將
別籌子挿而拔之次以花枝挿其充分植枝端輕
手按之令土密固常置陰濃處

種

樹法

今稱接樹宜除滿
成收開母日

葉微動為上時將欲開等

為下時樹身如釜柯及辟者皆堪挿大者四五枝
小者二三枝先將麻紉纏樹十餘匝不纏則恐挿

時皮破也以細齒鉗截樹去地五六寸斜截竹為
簾刺木皮之除令深二寸許折取好果枝長五
六寸亦斜截之令過心大小長短與竹簾等以刀
微割樹枝斜截之際剥去黑皮勿令傷青皮傷則
死枝出竹簾插枝令倒割處木通向木皮通向皮
要兩皮相合插訖以綿裹樹本頭封熟牛糞泥於
上一云用素皮裏縛以泥封之節土培覆令樹枝僅得
出頭當枝上沃水以土覆之一云以葉簾裹其上
而枝上培土時勿令堅固慎勿使掌撥口則折枝
既不沃水培土將勿令堅固慎勿使掌撥口則折枝
既生樹傍有柴輒去之不甬則分氣長遲此法百

不一失其十字破接者十不收一 腰接其樹身
大者離地一尺小者離地七八寸截你木砧於砧
上對側劈開令深一寸每砧對接兩枝但以兩樹
皮相合用黃泥封之候活去一枝弱者若梨若桃
檣宜於赤梨砧上接之若栗子宜於櫟樹砧上接
之 根接附之地截去劈開以樹頭削尖挿之黃泥
封固以蠶繭之類澆水即活 凡接果樹取向陽
之枝則多結實甚妙

駟樹法樹芽未生之前於根傍寬深掘開尋攢心釘
地根截去謂之駟樹苗四邊亂根勿動用土覆蓋

等窠則結果肥大勝挿接者

嫁樹法元日己未出以磚石着夜間謂之嫁樹子繁

而窠十五日晦日同

諸果木不結果者元日五

更以斧班駁雜斫則子繁而不落

凡木皆有雌

雄而雄者多不結果可鑿木作方寸坑臥雌木填之以泥塗之乃窠

修果木法正月削去低小亂枝勿令分其氣力則結

果肥大

社日春果樹下則結果堅牢不落不結

果者亦依此而之

摘果法凡果初熟時以兩手採摘則年二結果此

果不全熟時、摘之全熟則抽過筋脉來年必若
不盛 凡果子初宰之年忌孝服人及僧尼所觸
依不得宰切宜忌之

劈果樹上鳥鳥法凡生人頭髮掛樹上則鳥鳥不敢

來食也宜 果子熟時必殺人盜喫一枚犯禽便

來食切宜謹之

辟果虫法元日鷄鳴時以火遍照果木上下則無虫

清明日三更以稻草縛樹上不生戴毛虫傷樹果

樹有蠹虫用杉木作釘塞其穴則虫立死

花樹虫孔以硫黃末塞之劈果樹虫孫纂法敗蝶

和硫黃末縛竹竿頭用火熏之

果樹非霜法凡果樹花盛開時遭霜則無子預於園

中貯惡草生糞天雨初晴北風寒切是夜必有霜

候此放火作燼少出煙氣即非其霜花不壞

種桑

五月榷熟時揀取魯桑葉大榷稀者淨淘晒乾熟耕

肥地成畦多着糞祀桑種之不得厚蓋則不

生柴棚掩之不使曝陽一三五五月收貯桑榷勿近

撒種常用木灌澆候芽留旺者一枝餘并前去待長一尺又上糞一編

當年得高四五尺明年正月二月及臘月亦可耕地五六

編五步栽一株不宜下處水浸則死栽時每根下
着_{初秋}一斤糞至_{每春秋上}糞培根三年即有椹堪採每樹得葉三十斤二
月以鈎杖壓下枝令着地仍以燥土雍之_{若以濕土壓則}
_{除爛則根易生}明年正月截亂種之栽後二年
慎勿採摘大如臂再移桑下常斫掘種菜豆小
豆則潤澤益桑橫行闊七步長行離四步對栽
中間可用牛耕做田不廢桑不致荒正月修桑
削去枯枝及低少亂枝掘開根傍用糞土培雍此
月若不修理則葉生遲而不茂臘月亦可五月

斫桑不可留，留至夏至用糞或蠶沙培壅如上法。
此時不斫則來春不生枝。每年及時科斫，以繩
繫石墜壓四面枝，令娑婆向下。中心枝亦壓倒，勿
令直上，則難採葉。元日雞鳴時以火把照桑
樹上下，則無虫。

種楮

楮必二月時之。

楮宜石堆邊，燥土掘地，卧植覆土。

頗厚，勿用足踏。以石疊之，則易活。待其稍長，由其
枝埋於土，仍以石疊其埋處，則便。別根，看根年生
久之後，用牛耕其根傍，則根露處輒復生。笋。膳。

月斫之正月燒其根不燒則不茂四月宜斫非臈月皮非此月斫者多致枯死臈月斫之亦可非臈月斫者多

每年斫之以木杵打斫頭則甚茂

漆宜濕地二月種十月亦可
乳漆六月及七月皆

可七月以斧斫破樹皮滴下其汁用竹管盛之則成漆

以哭承之則多得

正月雨水樵松柏
正月朔晦移松柏
二月三月亦可

松杉檜柏冬至後春杜前皆可種 春杜前常土

栽松百株百活過此時則不生 栽松去松中大

根畱四過鬚根則無不偃蓋 移小松宜帶土掘

取君以手拔難活 唐人移大松法二月初中旬

先泛鉄表其四方細斷本土勿傷大小根移種之

地掘地深寬先以麥數斗鋪之依前向背安其根

於鋪麥之上使根勿斷勿屈務舒蔓如在本地土

下橫豎伸縮皆如故又多取本土無雜以新壤初

筭也厚其土築之不緊懼傷根也再筭三築以往

薄其土筭之緊毋令土上舊痕至舊而止松之痕

露根埋則必死築訖四隅樹大柱用大繩旁紮之
令大風不摧根曉昏沃既之不停雖盈圍大木百
不一枯七月甲辰丙辰伐松下蠹

種側柏

種法上同五六月長霖時鋪秋麥於坎中而種之生

活不枯

種槐

槐子熟時收晒乾勿令生出夏至前十日水浸六七

日生芽勿傷其皮遇雨和麻子撒種當年與麻齊
以木繩攔明年再種麻護之長二年正月移栽

正月朔暨晦可移槐榆二三月亦可

種柳

正月二月取弱柳如臂大者長一尺五寸燒下頭埋
之用杵打窠常以水澆之先砍根下置大蒜一
枚一云置蒜一枚而種之永不生蟲

種頭菜木

二月種之春初採之煮作茹作菹食之

種果

果種及時收之去外毛於屋下著濕地埋之須淺毋
致凍損二月芽生種之遇冬以草裹之至二月解

冰仍用籬圍之三年勿使人觸着 栗種一房入
三箇者為雀而必擇其居間者種之若種居兩邊
者一房入一箇者則貯結之窠皆為一房一箇
初種栗時掘地鋪瓦填土其上而種之則根不淺
入便於移栽秋冬間作坑鋪糞覆土而標記之至
及明春移栽坑中則善活易長種栗而不栽者難
生 種栗生活後鼠取其種人或掘食則其栗永
不結窠切宜忌之

種棗

二月選好味者多種之候芽生高者移栽三步一樹

至花開時以杖擊樹振去往花則結實多至五月
午日用斧於樹上斑駁敲打則結實肥大其味尤
佳 元日嫁樹時若寒不可斫則子萎 寒熟
着霧則多損用糝麻散綫於枝上則可辟霧氣若
用稻稈於樹上四散綫縛則亦不傷損

種胡桃

二月以乾胡桃種之能生若近馬糞則死長後亦然
移種四五次則皮薄肉肥不移則皮厚肉少

種杏銀

銀杏有雌有雄 有三稜雌有二稜須相對種之照

影亦能結實宜臨水而種 二月以銀杏枝新作
丁字形烙定兩頭埋地則活 銀杏不結實鑿方
寸穴臥雌木填之乃實試之即驗

種梨

春分日將旺梨^旁篇作拐揉斫下兩頭用火燒紅鉄咒

烙定津脈卧栽於地深二尺許春分前後一日皆
不可只宜春分日與上枝種法參看 梨老不結
實剥其厚皮則即感多結

種桃杏李

栽桃宜密栽李宜稀可南北行杏宜近人家栽而不

可密 井邊不宜種桃

杏李接連皮肉種格肥

地至來年帶土接移栽

杏熟時并肉接埋糞中

至春生後即移栽不移則索火味若樹下一歲不

須耕之則肥而無實

桃核不刮皮肉刷洗縫中

俱要潔淨仍令女子艷紅種之他日花艷麗而子

離核 桃熟時牆角腰處寬深為坑收濕牛糞納

於坑中以桃核數十箇尖頭向下厚蓋尺許春深

芽生和泥接栽接杏則最大接李則紅甘 石曼

卿以泥裹桃核為彈拋擲山嶺一二歲間花發滿

山 桃三年結實五年盛七年衰十年死至第六

年以刀刮開皮令膠出其樹多有百年活桃樹
五年不結子蓋樹皮緊束樹身不得長故也凡三
年日用元用尖刀刮破樹皮直長者四五條其數多
結子元日五更以石頭安李樹梗中更以長竿
打其樹梢結子繁除夜同

種櫻桃

四月露雨時護櫻桃好枝如指大者肥土中插之最
易活櫻桃栽時多以雞羽壅根則盛于又肥大
櫻桃枝老則不旺宜割移櫻桃俗名曰移徙樂以米
泔水頻澆則子大早熟

種木瓜

種法與桃李同秋杜前後移栽次年便結子勝於春

栽堅枝亦生

種葡萄

二三月間截取藤枝旺者約長三尺許抑蘿菑肉栽之埋二尺在土中生根留三五寸在土外外候苗長藤上架用米泔頻澆之澆一云常以糞肉肥汁放冷根三月後以清水解之冬月用草包護防其凍損以藤穿盆窠土候根生斫斷移種傍樹栽葡萄春間頻澆樹作一窠引葡萄枝從窠中過候枝長塞滿窠中所出葡萄

葡萄根托寒以生其肉案如寒用射入皮則案香
用密水灌根則甘永禧歟齋庭所種馬乳葡萄
葉落後收其枝條豎屈根上覆以空石冬瓦庭雪
惟積其上雪消上架無一枯枝終歲無出蓋雪多
則麥盛藤雪水能殺出故也

種楂果

楂果與丹杏沅皆不能種子只宜接移而植果例杏
多出餘幕枝條雖繁率多枯死以月經水常灌
根則無此患

種色松

凡者老松枝幹屈曲嶙峋，夏枯槎老，針葉針細短，稍帶子粘着，万年花寄生岩石間者，為上。然性燥多不活。今年截大根壅土，次年移盆，便活。三日一澆，不置陰處，霖雨須覆根，勿令蒸濕。老松根弱，不能耐寒，收入土窖。

種萬年松

萬年松須層枝翠葉，如條絲下垂，身幹回曲如赤蛇。騰林香氣清烈者，乃佳。葉白有刺者，乃下品。二三片擇者，折枝插別甕，置陰處。徐澆水，則活。更數新葉必鬆，有刺年久，遂如條絲，性大惡人氣。

火焰且能耐寒冬日移栽陽地明春復栽盆中為
砂澆水不止亦勿置樹陰下好生金剛妙香兩山
絕頂衲子採之作佛前香

種竹

董竹郎俗所謂王竹淡竹郎綿竹苦竹郎烏竹也

竹有雌雄有根而上至生稍一節發者為雄二節
發者為雌根上一節獨枝雌者多笋種竹當種雌

種竹用本命日謂正月一日二月二日三月三

日之數類種竹多用辰日甲辰竹解日自二月至

山谷所謂竹須辰日斷箭着上番成是也又用鴈

月杜陵所謂東林竹影薄陂月更須栽是也非此
時移之不活唯五月十三日古人謂之竹醉日多
又謂之竹迷日栽竹多茂盛五月十三日為竹
本命日栽之百無一死頻試實效五月十八日
栽竹一云二十日為上或曰不必五月每月二十
日皆可又云用辰時遇火日及有西風則不可
種竹先期兩三月或半年去竹本一二尺以錘
斷其根仍以土覆之數以水澆至期乃移即活不
損葉蓋以已斷得根竹本未動故移之無所傷
種竹宜高平無水處黃白軟土為良竹性喜向西

南引根斷凡西南根并莖於園中東北角種之
竹根無不向南但取向陽者向北而栽必用雨下
諺云栽竹無時雨下便移多留宿土記取南枝
種竹無時但連陰中種之者皆活掘溝深闊以
乾馬糞和細泥不用馬糞拌土填高二尺冬凋夏稀
然後種之須三四莖作一叢亦須土鬆淺種不可
增土於株上若用鋤頭打塚泥則不生笋打一下
一年不生打兩下二年不生種竹須覆土杆等切
勿腳踏則笋不生忌脚忌手把若洗面水澆着
即枯種竹須忌搖動先截去竹梢縛架護之為

妙 畱莖種者被風動搖多不遂茂但去根一尺
許截去埋栽令露竹頭當年生笋踐殺之明年轉
益大又踐殺後年長之一抽幾丈 八月鋤竹圍
以糞糠或麥糠壅之而各用二糠不可和雜水澆
水澆則或以河泥蓋之亦妙 竹苦不旺埋大猫
糞根下則笋遂盛 引笋法隔籬埋狸或猫明年
笋自遂出 障竹根法竹根多穿壞堦砌堆聚皂
角刺埋土中障之根即不過又法以油麻梗縛成
小把埋地根亦不過 治竹枯法竹有花結實
如猓謂輒枯死一竿如此久則舉林皆然其治之
之竹木

之法擇一竿稍大者截去近根三尺許通其節以
大糞窠之則止 諺云翁孫大相見子母不相離
謂隔年竹可伐也伐竹宜七月辰日庚午日癸卯
日六月六日亦可冬至日及臘月所者不駐 十
一月十二月癸日忌伐竹 魚竹都下氣寒所存
者唯烏^鳥班竹耳班竹經歲則變烏五六月梅雨時
擇新竹挺直葉短枝密者栽盆斷其橫根右左各
連數節勿動接竿處少有動搖葉卷不舒終必枯
年久引根抽笋則盆中隘窄不容須移栽而陽處
初移盆上勿令見日收藏勿使過暖亦勿過凍澆

水不燥

種花總叙

盆種花樹法先於冬間取陽溝泥晒乾篩去礫瓦又
用大糞潑濕晒乾如此三四次了以乾柴草一重
肥出一重發火燒過收藏至正二月間便栽花果
樹木或種花木子粒每用^{如無雞鴨}糞過退鷄鴨毛水
浸水用蠶沙與肥水糞水相和澆之如花上發萌下
便行根此時不可澆肥鳥死如嫩條長成或澆肥
生花頭再使澆肥花開時又不可澆肥逐日早晚
只澆清水如結果者已結不可澆肥澆肥則落矣

凡花三四月間便可上盆 催花法凡花用馬糞
浸水澆之三四月間者次日盡開 花色變改法
花紅者令白以硫黃燒煙熏盡子蓋花則白 變
白牡丹五為色 變紅白蓮為青色 百花所忌
花忌射香如或遇射而損宜於上風頭以艾和雄
黃半焚之即如和 凡花取忌孝子孕婦手折則
數年不著花切宜禁之排盆法 凡花盆須置陰
陽脩處花盆皆置甌甌上乃佳 狀石榴梔子山茶
四季等花 燄者花謝後須掘地埋盆與地面相齊
以度地氣 凡花木久置牆籬下花蒂枝葉皆向

人傾側須數二輪轉勿令久當一面收藏法凡
造土宇擇向陽高燥處簪之向南作一窗令不狹
隘以便出納以通地氣收藏亦勿太早須經霜二
三次收入乃可天氣溫昶時莫令閉窗若遇極寒
用苫厚蓋勿致凍傷立春後常不蓋開過寒食出

種梅

五月收取梅枝至來春二月間種於庄前後數百株
至冬雪間花開香氣襲人入骨到結實造為烏梅
亦可資生梅宜十二梅子爛熟時帶肉埋於肥
土中候出芽灌澆至十月已長七八寸或一尺者

有之至第二年伺長二三尺方可移栽十月間可
但掘坑深埋不使搖動不避燒瘠之地却不可失
水盆梅以韻勝以格高故以橫斜踈瘦與老
枝奇怪者為貴其相嬾枝直上者謂之氣條無所
謂韻與格矣凡接梅先將小桃栽盆懸掛梅傷
剝去梅桃兩皮合而用生葛堅纏縛氣通皮縫
相接後漸去木梅俗所謂奇接置盆陰陽相半處
頻以水澆交結枝稍作橫斜老梅形甚蕾著枝則
入暖房數以溫水噴其枝根傷蟻蠹炭勿觸寒氣
可於冬至前綻開花謝後不受寒氣復納土字猶

可結窠若數觸寒氣非但不能結窠條亦枯矣
用瓦甕澆水不燥欲作枯梅須接筭葉梅若先不
抽枝已不蒼蒨則移植向陽處縱其行根便成大
樹冬青樹上接梅則開西墨梅

種菊

家菊有奢侈氣不可栽紅色者凡惱人不清惟甘菊
可種紫莖黃色引蔓子真淵明所愛也移根易活
花開自落於地來年即生何春苗及許時掇去
其顛則歧出兩枝又掇之每掇盡歧至秋則一幹
所生數千百葉婆娑如車蓋熏籠菊根忌惡水

不宜以水澆之於根側置水一盞剪紙條一枚濕
之半纏根莖上半在盆中自然引上也 凡養菊
毋將舊氣須於五月內因兩掘坎半尺許先填肥
土次覆沙土每一坎分種一條二弱者用葦條扶
之條大枝繁更用海竹尖扶之枝孤而長截去枝
末令歧之著根後用肥土覆根自然茂盛然過曝
葉黃赤過雨萎黑切忌之地種須擇不濕處盆用
瓦甃開花後移種盆亦得 用溝渠肥土揀去
瓦礫碎軋蒸熟和芝麻油滓種盆中易長而無出
生傷根之患

種蘭

一幹一花而香有餘者蘭也一幹六七花而香不足者蕙也將以沙石則茂沃以陽若則芳且所同也

蘭葉似麥門冬而潤且勒長及一二尺四時常青花黃中間葉上有細者紫點有春芳者為蘭色春

秋芳者為秋蘭色淺葉不香惟花香盈盛置座

隅滿室盡香

蘭叢生山谷紫莖赤腳絲葉光潤

一幹一花間有瘦頸者花兩三瓣幽香清遠可捲

花有數品或白或紫或瑱碧花常在春初雖霜冰之餘高潔自如爾蘭草裁無時家種者八九月

分栽 分蘭法前期月餘瓦沙去礫使糞夾和晒
乾儲之至寒露後擊破元盆經年解折去舊蘆頭
存三年之類或三類四類作一盆下沙欲其疎
則通而積雨不能積上沙欲其細則潤而細日
不能燥晴孰宿露肥瘦適宜則活 本國蘭蕙品
類不多移盆後葉漸短香亦無生湖南沿海諸山
者品佳霜後勾傷垂根帶舊土依古方栽盆為妙
蘭葉一年不能盡長明年季夏必抽二時澆水不
止常置陰陽處勾令乾燥收藏勾暖亦勾蒸人氣
種蓮 其葉為荷其葉為蓮其根為藕其花
未發為蓮苗已發為芙蓉總芙蓉名

八九月用蓮子聖黑者枚磚上磨其頭令皮薄取溝
邊土作泥包果約三指大長二寸磨處尖銳蒂頭
平重候泥乾擲池中重頭即有肉下薄皮向上易
生草理泥色立夏前三兩日掘藕根取節頭種泥中二月用帶
集栽泥內當年即便開花初春取藕根三節無
損者種入泥坑令到硬土當年有花五月二十
日浸種蓮柄長者以竹枝扶之無不活凡種蓮
紅白不宜並植白盛則紅必殘一池內須作隔分
種七法須依古方但不拘節日耳蓮子藏瓮瓮
中經年後種之生青蓮花以二大瓮分種紅白

蓮種時悉去傷根勿令荷柄雜擾雜擾花不開始
冰藏倉陽處勿使凍破明春取埋開花益盛若重
不能轉動則掘去宿根空其坑明年改種亦可

蓮極畏桐油

蓮池切忌沉蒿絕種

種木芙蓉

或稱木蓮八月開
花一名非霜花

四月露雨時選好枝如指大者肥土中挿地最易活

二月十日

取叢生傷枝移種花白如蓮可愛

唐人詩曰木末芙蓉花山中發紅萼中國木芙蓉

似異我國於所謂木蓮也

種山茶花

俗名柏

南方草木記有紅白二種曰寶珠山茶樓子山茶千
葉山茶格物論有幾種曰寶珠茶石槲茶梅榴茶
踴躅茶茉莉茶宮粉茶皆粉紅色一穗紅照慶紅
葉各不同東國所植者唯四種單葉黃花雪中能
開者俗號冬柏即格物論所謂宮粉茶也單葉粉
花春始華者俗號春柏即格論所謂宮粉茶也都
下所養千葉冬柏即格物論所謂石槲茶也又有
千葉茶心看金粟者即所謂玉珠茶也大抵千葉
石槲茶葉導淡綠花葉皆成碎花好事者皆以為
貴態不及寶珠茶絕勝也單葉茶葉色微黃或綠

不佳 單葉冬柏春柏好生南方海島中南人伐
之為薪摘實取油亦為沐髮之膏都下種實則一
一抽條可移植於小盆倚接千葉一依接梅之法
百接百活但易燥數澆之 挿之則單葉易生千
葉最難活若寒食後十餘日斫千葉枝三寸許密
挿盆土掘一坑一尺許置盆其中晝則覆之不令
見日夜則開之得承露氣過半生根 茶葉喜着
塵埃數用布子淨刷務令光膩收藏勿使枝葉接
着他物寒暖亦宜時中亦勿近人火氣澆之不濕
不燥勿曝畏日

種梔子花

梔子又名簷蔔蜀有紅梔花雜俎曰諸花少大出唯
梔子花六出梔子有四美花色自腴一也花香
清潤一也冬不敗葉三也葉染黃色四也簷蔔
帶花移易活霎雨時挿嫩枝易生挿法不須依
古法折枝頭三寸許稀挿盆中置陰處便活雪
花六出石六六稜陰氣所鍾者皆六數也此花大
陰氣所鍾故花瓣六出而性大惡溫暖收藏過暖
則枝葉萎黃不能發花凍傷六不可衆花中收藏
最難澆水勿燥勿曝畏日

種瑞香花

瑞香草也。有黃白二種。冬春之間其花始發。紫花

葉青而厚似橘葉者最香。楊誠齋詩曰：紫茸翻了綠花枝。本朝李陶隱詩曰：綠葉紫花香可烈。瑞香皆以綠葉紫花者為最勝。一萼纔綻香瑞一庭花。謝子祐亦如櫻桃。直閒中勝友也。四月間須乾節。無下階。墓上去屋簷。隔水二寸許。種之在屋下太深亦不可。地氣寒且栽。種不可露根。露根則不榮。瑞香根甜。蚯蚓喜食。以洗衣服灰汁及小便澆去。蚯蚓以漆罈壅之。以退牲水。渠鵝

斗燭猪陽澆之茂盛盆以小便雞鴨壯猪湯之則
清之水作二瑞香思濕畏日瑞香根和脆如亂

髮過曝過濕皆致損傷其葉甚綠瘡厚者乃不失

常性也若黃軟多皺者目過曝過濕根本受病使

然也須易土改栽置陰處澆水不濕不燥還如舊

時菁川子得此花酷愛之考諸古方見惡濕畏日

之言乃得栽培之術也收藏太早則土室過暖

葉脫落須經霜五六次乃可收藏

種石栢花

栢花來從安石國故名安石栢來從海外新羅國者

曰海榴此花附蔓皆直紅色辨如提丹鬚黃栗密
有千葉者有黃花紅花白花紅綠花花品中一奇
也花有黃赤二色實有甘酢二種甘者可食酢
者入藥又有一種子白瑩澈如水肅者味亦甘
謂之水晶榴以千葉不結實者謂百葉榴直幹
層枝上尖大者謂栢榴幹樣上疎枝如張蓋者下
謂桂石榴數枝叢生枝柯錯亂者謂藪石榴數榴
之中唯栢榴甚佳凡石榴直枝如指栢大者長
一尺以八九條為科燒下頭二寸握坑渾一尺七
寸曰經一尺堅枝坑畔置雞骨姜右欹枝間築下

土出枝頭一寸水澆即生

折取一二寸許密押別處置澆處即出

葉未生時用肥土於嫩枝條上以簾草包裹束縛
用水頻澆自然生根截下栽之用碎石覆壓則易
活 株枝少稀則屈其稀處必生新枝此因氣不
直上結於屈處故枝生 石榴花日中常晒日午
澆清水早晚亦澆若有嫩芽長起便與捻去心
榴子結時澆水勿令太過 凡榴多結涼則枝必
枯相揀柄勿令腰上結窠只有一二顆餘悉摘去
舊根盤結枯朽則涼不能結須鋸之 元日以
石頭安放樹叉間或堆積於樹根則結窠大而多

收藏毋使枝梢近地亦勿大暖

種倭躑躅

花辦甚大色類石榴重跗疊萼久而不衰收藏勿暖

澆水勿濕

種四季花月季花

花有三種其花紅辰戌丑未月播芳者四曰月季花
粉葉圓大者曰月季青條引蔓春杜一度發花者
曰青竿四季青竿不佳四季初開遇曝色殷不
曝色淡欲開時頻以水噴之令枝不燥常置陰陽
處眼本損傷則出氣成松皴看時柔向不滋枝枯

無花須用桃枝淨刷又揉桃葉塗之苟不如初須
剪去病枝無鮮舊用根肥壤改栽又以肥水澆之
下行新根必上抽枝便著花夢矣雖無白蘂久不
抽枝改栽為妙收藏太暖則嫩枝抽生遇寒旋萎
月季方開曝日則落枝不發須於陰處置盆花
發便即出外

種海棠花

唐人以海棠花為花中仙神冬至日早以糟水澆根
其花鮮盛結子剪去則來年花盛

種紫微花

俗名百日紅
性不耐瘴樹間
文處以指爪搖之則枝葉皆動

樹身光潤高文餘花辦紫殷聚小為天成朵如拳蠟
野茸萼赤瑩葉對生六月始花開謝接續可至九
月我國嶺南近海諸郡多植此花但風氣差遲
六月始開至九月乃歇錦英露艷照映庭除風格
最是流麗嶺北風氣嚴烈凍死殆盡幸賴好事者
收護僅得免死十有一二耳梅雨時折挿置陰處
即生新枝用竹扶之矯作栢樣榴形乃佳收藏勿
暖澆水不燥

種丁香

二月十月取叢生枝根移種即活
月開花香氣滿

二座

折板為丁字形焙定兩頭橫埋於地亦便生

根

種小花

接於柳樹或桃樹便活二月開花

種山菜黃

未凍前解冰後皆可種二月開花紅紫亦可翫以

雞糞壅之則盛

種牧丹

六月取子以水試之取其沉者以糞土拌盛之至八

月種於畦來春生芽

秋社前或秋分後移栽

九月可記取南枝多留宿土歐記云必每窠用糞土
一斗歐記云白欽末一斤拌勻栽之歐記云牧丹根甜多引蟲
食白欽勿斷鬚根勿令脚腦用水澆灌
能殺蟲
四傍掘土填牛糞以水澆之糞水滲入一培茂盛
牧丹不接則不佳須用秋社後重陽前過此花
之本去地五七寸許栽之乃接以泥封裏用軟土
壅之作養子罩不令見風日此接花之本也
以
奄木接牧丹高數十丈一本發數朶者擇其小
者去之止留一二朶謂之打刺慎分其脉也花後
花便剪去其枝勿令結子懼其易先也以冬至夜

撥開根脚下土至來日以水缸內石衣搥令細和
肥土壅之一云以水池內青簍衣拌花即開得數
日茂盛花開漸小放舊者蓋蟲損之損必尋其
穴以硫黃簪之其傍又有小穴如針孔乃蟲所藏
處以大針點硫黃半針之蟲乃死花復盛此醫花
之法也不可以烏賊魚骨針花又死牡丹根下
以紅花汁紫草牙疏根隨色而愛愛白牡丹為
五色皆效其根

種芍藥

九十月時悉出芍藥花根祿以甘泉熬後剝削老硬

病腐之處揉調沙糞以培之易其故土。初大三年
或二年一分不分則舊根老硬而侵食新芽故花
不成就也。花既萎黃亟剪其子壓盤披條使不
離散脉不上行而皆歸於根明年花繁而色潤

種葵花

一名蜀葵有紅
白黑粉紅數色

二月以葵子置水中高撒於地種之則生枝幹亦高

種石竹花

我國石竹花只是紅色唐石竹則花有五色秋枚子

春種之輒生尤喜石間燥處種階牆上亦能生

種萱草

一名宜男草
一名合歡花

移根稀種一年自稠

種芭草

蕉乃植物中之最軟脆者也。大燥則焦，太濕則敗。法
得則易榮，法失則易枯。壺其土，疎融解，夜無霜威。
擇丰陽地，掘坑，城圍安根，壅壤務要軟肥，封齊舊
痕，沃勿暫晷，及乎清和，屈節南薰，始至宿莖，浮青
新葉，含翠瀆馬，漫放敗蘗，互列而沃，宜芽不閏。
而益達氣，舍腴而增熾，及乎嚴霜始肅，木葉幾脫，
命健僕以破培，望留尺而乃割，藏諸土，宇力近中。
失列植岸頭，培而軋糠，其怕人氣烘煖，為良最忌。

冷濕易致損傷

種石菖蒲

一名昌歆

取積年溝渠中瓦為末種之

初春採盤根袖葉者

剪鬚根列置恠石下用碎石鎮之以石泉浸灌不

令水有臭氣自生根盤結石上石菖蒲喜洗

根頻洗則華袖而秀極怕恠被湮遠無不爛死

收藏勿使太暖

用砂石器安恠石種石菖蒲

於石峰間朝二易水則茂濁有泥滓則則萎近傳

日本有道人將一大螺殼種石菖蒲日三易水養

之三十年只見細髮出水置之座間使人夏涼冬

煖云一寸九節者真品江西天竺洞天洪崖丹井
兩處所生九節者種之一年至春剪洗一發愈剪
愈細夜燈觀書置一兩盆可以收煙不薰人眼星
月之下置一盆至朝取葉尖露珠以洗目大能明
目久則可以白晝見星栽於石山亦可種炭上炭
必用有皮者佳即今種於石者乃巖菜非石
菖蒲也石菖蒲一如菖蒲而細短葉用石菖蒲是
也處有之

附怪石

以古諸書考之怪石皆湖海中出而吾東方所翫從

者皆採於山松都南二十里有敬天寺寺之北三
四里多產怪石石色青碧峰壑峭峻懸崖絕壑隱
隱若藏畜雲雷之形置鑪中則能引水至峰頂雖
日中不乾苔蘚斑斕形摸一似沉水香故謂之沉
香石真天下絕宝也出新溪縣者石理細嫩水不
能上出安山郡者黃赤多土色皆不佳也近世出
豐川者
頻佳出丹陽者善引水生水落山怪石峰者堅
至峰而黃赤多土色
而上水色蒼黑世人不曉事如得沉香石便斷
嵌穴洞貫前後或種巖菜及雜卉放凹處此皆鄙
俗所謂沉香石石理自成竇穴中穴著細砂水一

入石底穴口則接濕細沙自然引至頂上若多斷
嵌穴石理斷絕則水不能上種巖菜使根穿入穴
中則非但不潤石亦圻裂皆妄之尤者若石品甚
佳苔髮自生石間森々_二_一_三_四_五_六_七_八_九_十_{十一}_{十二}_{十三}_{十四}_{十五}_{十六}_{十七}_{十八}_{十九}_{二十}_{二十一}_{二十二}_{二十三}_{二十四}_{二十五}_{二十六}_{二十七}_{二十八}_{二十九}_{三十}_{三十一}_{三十二}_{三十三}_{三十四}_{三十五}_{三十六}_{三十七}_{三十八}_{三十九}_{四十}_{四十一}_{四十二}_{四十三}_{四十四}_{四十五}_{四十六}_{四十七}_{四十八}_{四十九}_{五十}_{五十一}_{五十二}_{五十三}_{五十四}_{五十五}_{五十六}_{五十七}_{五十八}_{五十九}_{六十}_{六十一}_{六十二}_{六十三}_{六十四}_{六十五}_{六十六}_{六十七}_{六十八}_{六十九}_{七十}_{七十一}_{七十二}_{七十三}_{七十四}_{七十五}_{七十六}_{七十七}_{七十八}_{七十九}_{八十}_{八十一}_{八十二}_{八十三}_{八十四}_{八十五}_{八十六}_{八十七}_{八十八}_{八十九}_{九十}_{九十一}_{九十二}_{九十三}_{九十四}_{九十五}_{九十六}_{九十七}_{九十八}_{九十九}_{一百}_{一百一十}_{一百二十}_{一百三十}_{一百四十}_{一百五十}_{一百六十}_{一百七十}_{一百八十}_{一百九十}_{二百}_{二百一十}_{二百二十}_{二百三十}_{二百四十}_{二百五十}_{二百六十}_{二百七十}_{二百八十}_{二百九十}_{三百}_{三百一十}_{三百二十}_{三百三十}_{三百四十}_{三百五十}_{三百六十}_{三百七十}_{三百八十}_{三百九十}_{四百}_{四百一十}_{四百二十}_{四百三十}_{四百四十}_{四百五十}_{四百六十}_{四百七十}_{四百八十}_{四百九十}_{五百}_{五百一十}_{五百二十}_{五百三十}_{五百四十}_{五百五十}_{五百六十}_{五百七十}_{五百八十}_{五百九十}_{六百}_{六百一十}_{六百二十}_{六百三十}_{六百四十}_{六百五十}_{六百六十}_{六百七十}_{六百八十}_{六百九十}_{七百}_{七百一十}_{七百二十}_{七百三十}_{七百四十}_{七百五十}_{七百六十}_{七百七十}_{七百八十}_{七百九十}_{八百}

攷事新書卷之十一

